

1.8. Canonical Forms of Matrices

- 3. The *geometric multiplicity* γ of an eigenvalue λ of A is the maximum number of independent eigenvectors associated with it. In other words, the geometric multiplicity γ is the dimension of the eigenspace $\text{Ker}(A - \lambda I)$.
- 4. A matrix is *derogatory* if the geometric multiplicity of at least one of its eigenvalues is larger than one.
- 5. An eigenvalue is *semisimple* if its algebraic multiplicity is equal to its geometric multiplicity. An eigenvalue that is not semisimple is called *defective*.

Often, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ ($p \leq n$) are used to denote the *distinct* eigenvalues of A . It is easy to show that the characteristic polynomials of two similar matrices are identical; see Exercise 9. Therefore, the eigenvalues of two similar matrices are equal and so are their algebraic multiplicities. Moreover, if v is an eigenvector of B , then Xv is an eigenvector of A and, conversely, if y is an eigenvector of A , then $X^{-1}y$ is an eigenvector of B . As a result, the number of independent eigenvectors associated with a given eigenvalue is the same for two similar matrices; i.e., their geometric multiplicity is also the same.

1.8.1 Reduction to the Diagonal Form

The simplest form into which a matrix can be reduced is undoubtedly the diagonal form. Unfortunately, this reduction is not always possible. A matrix that can be reduced to the diagonal form is called *diagonalizable*. The following theorem characterizes such matrices.

Theorem 1.6. *A matrix of dimension n is diagonalizable iff it has n linearly independent eigenvectors.*

Proof. A matrix A is diagonalizable iff there exists a nonsingular matrix X and a diagonal matrix D such that $A = XDX^{-1}$ or, equivalently, $AX = XD$, where D is a diagonal matrix. This is equivalent to saying that n linearly independent vectors exist—the n column vectors of X —such that $Ax_i = d_i x_i$. Each of these column vectors is an eigenvector of A . \square

A matrix that is diagonalizable has only semisimple eigenvalues. Conversely, if all the eigenvalues of a matrix A are semisimple, then A has n eigenvectors. It can be easily shown that these eigenvectors are linearly independent; see Exercise 2. As a result, we have the following proposition.

Proposition 1.7. *A matrix is diagonalizable iff all its eigenvalues are semisimple.*

Since every simple eigenvalue is semisimple, an immediate corollary of the above result is as follows: When A has n distinct eigenvalues, then it is diagonalizable.

1.8.2 The Jordan Canonical Form

From the theoretical viewpoint, one of the most important canonical forms of matrices is the well-known Jordan form. A full development of the steps leading to the Jordan form is beyond the scope of this book. Only the main theorem is stated. Details, including the


Handwritten notes and calculations at the bottom of the page:

- $\{ \dots \} \Rightarrow$
- $p(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 4)$
- $\sigma = \{1, 4\}$
- $\text{eig } \lambda_1 = \{v = (x, y) : Av = \lambda v\}$
- $\lambda_1 = 1 \Rightarrow m_1 = 1$
- $\lambda_2 = 4 \Rightarrow m_2 = 1$

ماتريكة مربعة
عن طريق نظرية
الرتبة

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

تجدد في محاوره
 $\Rightarrow P(\lambda) = \{1, 5\}$



block diagonal

proof, can be found in standard books of linear algebra such as [164]. In the following, m_i refers to the algebraic multiplicity of the individual eigenvalue λ_i and l_i is the index of the eigenvalue, i.e., the smallest integer for which $\text{Ker}(A - \lambda_i I)^{l_i+1} = \text{Ker}(A - \lambda_i I)^{l_i}$.

Theorem 1.8. Any matrix A can be reduced to a block diagonal matrix consisting of p diagonal blocks, each associated with a distinct eigenvalue λ_i . Each of these diagonal blocks has itself a block diagonal structure consisting of γ_i sub-blocks, where γ_i is the geometric multiplicity of the eigenvalue λ_i . Each of the sub-blocks, referred to as a Jordan block, is an upper bidiagonal matrix of size not exceeding $l_i \leq m_i$, with the constant λ_i on the diagonal and the constant one on the superdiagonal.

The i th diagonal block, $i = 1, \dots, p$, is known as the i th Jordan submatrix (sometimes "Jordan box"). The Jordan submatrix number i starts in column $j_i \equiv m_1 + m_2 + \dots + m_{i-1} + 1$. Thus,

كلمة block موزون
المعبر عنه من p
التي هي اعداد صحيحة

$$X^{-1}AX = J = \begin{pmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \dots & \\ & & & J_i & & \\ & & & & \dots & \\ & & & & & & J_p \end{pmatrix}$$

شروط بالوضوح
اشكال
مجردة

where each J_i is associated with λ_i and is of size m_i , the algebraic multiplicity of λ_i . It has itself the following structure:

رسم بياني
المتعلق بالاشكال

$$J_i = \begin{pmatrix} J_{i1} & & & \\ & J_{i2} & & \\ & & \dots & \\ & & & J_{i\gamma_i} \end{pmatrix}, \text{ with } J_{ik} = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \dots & \\ & & \dots & \\ & & & \lambda_i & 1 \end{pmatrix}$$

سواء
لا
تفرص المتغيرة
المربعة

Each of the blocks J_{ik} corresponds to a different eigenvector associated with the eigenvalue λ_i . Its size l_{ik} is the index of λ_i .

1.8.3 The Schur Canonical Form

Here, it will be shown that any matrix is unitarily similar to an upper triangular matrix. The only result needed to prove the following theorem is that any vector having a 2-norm can be completed by $n - 1$ additional vectors to form an orthonormal basis of \mathbb{C}^n .

Theorem 1.9. For any square matrix A , there exists a unitary matrix Q such that

$$Q^H A Q = R$$

is upper triangular.

Proof. The proof is by induction over the dimension n . The result is trivial for $n = 1$. Assume that it is true for $n - 1$ and consider any matrix A of size n . The matrix admits $\dim \text{eig } S_{\lambda_2} = 1 \Rightarrow \lambda_2 = 1$

$\Rightarrow = \left\{ (x, y) : x = \frac{3y}{2} \right\}$ $\text{eig } S_{\lambda_1} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

المحاورة الثامنة :

ب الصفحة الخامسة عشر

1.8.2 : شكل جوردن : القانوني :

من وجهة نظر نظرية ان من اشهر الاسماء القانونية للمصفيات هو شكل جوردن المعروف .

ان القرار الكامل للمصفيات المذكور في شكل جوردن هو ما في موضع هذا الكتاب .

سوجد منه فقد النظرية الاساسية .

القاضي تاج الدين البرهان لم يذكر ان كدها في اكتب الاساسية للميد الحفر

لا صفاً : سترز ان العندوة المذبذبة للعبة الذاتية λ

و / قترز - دليل اللعبة الذاتية

لغز : الدليل هو اصري وجمع صعب كصفة الملاقة λ صفة

$$\ker(A - \lambda I)^{n+1} = \ker(A - \lambda I)^n$$

« الصفحة السادسة عشر »

نظرية 1.8 :

ان اي مصفوفة يمكن ان تحول الى مصفوفة قطرية عن طريق ضرب مصفوفات

تسمى block تبعد كل مصفوفة P من المربعات $m \times m$ القطر .

كل بلوكه رتبة رتبة ذاتية قطرية λ

ان كل هذه المربعات القطرية لا تميز قطري ذاتي اي $m \times m$ بلوكه ايضا بلوكه

مربوع λ صفة λ هي اللعبة ذاتية الرتبة الذاتية λ

سار الى كل بلوكه مذبذبة $m \times m$ بلوكه جوردن .

ان كل بلوكه مذبذبة هي مصفوفة ثنائية القطر علوية مرتباً لا سجاور ول

اللعبة الذاتية λ والذي هو μ صفة $\mu \leq m_i$ (العندوة الجديدة)

تتضمن اللعبة الذاتية λ m القطر الاول والثاني m القطر الثاني


ان بلوكه m تعرف m m مصفوفة جوردن المذبذبة وانها تميز مصفوفة جوردن

ان مصفوفة جوردن المذبذبة ذات الرتبة n تبدأ بالعدد الذي رتبته

$$n_i = m_1 + m_2 + \dots + m_{i-1} + 1$$

First block

$$x^{-1}Ax = J =$$



كل كتلة J_i تكون متعلقة بالقيمة الذاتية λ_i ومرتبة m_i (أي المرتبة
 J_i مرتبة = البعد البرية للقيمة λ_i)
 ان J_i ذات الأجزاء التالية:

$$J_i = \begin{pmatrix} d_{i1} & & \\ & d_{i2} & \\ & & \ddots \\ & & & d_{iy_i} \end{pmatrix} \text{ حيث } J_{ik} = \begin{pmatrix} \lambda_i & & & \\ & \lambda_i & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_i \end{pmatrix}$$

توضيح: ان كل كتلة J_i تتلخ لتلك الكتلة المرتبة
 J_{ik} عدداً مساوياً للمرتبة
 الرئيسية m_i للقيمة الذاتية λ_i

هذه الكتلة هي عبارة عن مستطيلات
 ناتجة القدر قطر على الرئيسي الاضلاع هي
 القيمة λ_i فكل مرة بعد البعد البرية
 والقطر الرئيسي التي هي m_i

ان كل كتلة J_{ik} تكون مرتبة m_i مرتبة بالقيمة الذاتية λ_i
 ان مرتبة المستطيلة J_{ik} هو m_i دليل القيمة الذاتية λ_i والذي هو البعد
 الرئيسية m_i

النتيجة الكاملة السابقة